



1- OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION :

Ce mode opératoire décrit les différentes étapes à suivre pour réaliser les prélèvements urinaires. Il s'applique aux prélèvements urinaires réalisés par le patient.

2- DOCUMENTS ASSOCIES :

F-C2-PR011	« Réalisation des prélèvements au laboratoire »
F-C1-INS002	« Préconisation pour le patient »
F-C2-ENR007	« Manuel de prélèvement »

3- RESPONSABILITES :

Les préconisations de prélèvement ainsi que le flacon de recueil adéquat sont fournis sur demande par le laboratoire.

Le recueil d'urine se fait par le patient lui-même sauf pour la pose de sonde où le biologiste et l'infirmière sont seuls habilités à effectuer ce prélèvement.

La personne qui réceptionne l'échantillon est responsable de la vérification du respect des conditions de recueil préconisées et de l'identification du prélèvement.

4- DEROULEMENT DE L'ACTIVITE :

4-1 Le matériel utilisé :

- Lingette imbibée de solution antiseptique sous emballage unique.
- Sonde urinaire enfant ou adulte.
- Sac collecteur pour les enfants en bas âge.
- Flacon stérile pour les ECBU.
- Flacon pour recueil des urines de 24 Heures
- Flacon pour les comptes d'ADDIS.
- **Flacon boraté**

4-2 Déroulement du prélèvement :

Le prélèvement est idéalement réalisé au laboratoire, mais peut être effectué au domicile du patient, en respectant les conditions de recueil ci-dessous et un délai d'acheminement court, ou les conditions de conservation (4°C) de l'échantillon.

4.2.1 Examen cyto bactériologique des urines (ECBU)

RECUEIL STANDARD DANS FLACON ECBU

Voir document F-C1-INS002 « Préconisation pour le patient, chapitre - Recueil d'urine pour ECBU »



LABM ORMEAU
8 chemin ormeau
65000 TARBES

Réalisation des prélèvements urinaires

Ref : F-C2-MO002-v03
Version : 03
Applicable le : 31-10-2016



RECUEIL D'URINES A DOMICILE POUR ECBU

Voir document F-C1-INS002 « Préconisation pour le patient, chapitre - Recueil d'urine à domicile pour ECBU. Flacon boraté. »

LE SAC COLLECTEUR POUR LES ENFANTS

Voir document F-C1-INS002 « Préconisation pour le patient, chapitre - Recueil d'urines chez un enfant. Utilisation d'un urinocol »

LE SONDAGE A DEMEURE (SAD) (EFFECTUE EN CLINIQUE PAR LES IDE)

- Clamper
- Attendre
- Récupérer l'urine fraîche dans le flacon stérile

LE SONDAGE POUR ECBU CHEZ LES PATIENTS INCONTINENTS

- Respecter les règles d'asepsie (gants et compresses stériles, champ...).
- Utiliser une sonde courte à extrémité arrondie.
- Recueillir l'urine en milieu de jet.
- Enlever la sonde.

COMPTE D'ADDIS

Voir document F-C1-INS002 « Préconisation pour le patient, chapitre - Recueil d'urine pour Compte d'Addis »

URINES DE 24 HEURES

Voir document F-C1-INS002 « Préconisation pour le patient, chapitre - Recueil des urines de 24h »

URINES POUR LA RECHERCHE DE CHLAMYDIA/MYCOPLASMES

Voir document F-C1-INS002 « Préconisation pour le patient, chapitre - Recueil d'urines pour la recherche de Chlamydia/mycoplasmes »

4-3 Identification :

La personne qui réceptionne l'échantillon l'identifie en y apposant une étiquette avec les nom, prénom, date du jour, N° de dossier.

5- GESTION DES DOCUMENTS :

Sans objet.